王

氏

醫

案

内午春高漢芳患滯下色醬日數十行年已七十七歲自去秋 。 杭州王士雄孟英醫案

日·七次月日本東日開了 44.11

劑而安繼與調補竟得霍然後三載以他疾終

少等 所野 遊縣 取水大

○、○、○、○、○、○○○ 葉畫三姪女適朱氏上年四月分娩七日 月患赤痢其家謂產後

一 上 医自己人名约名为

勢極危殆相衾咸備無生望矣所親陳仰山聞之謂云去秋願章養雲室思咸適遇猝驚黃包二醫皆主温補乃至昏瞻痙厥。 西洋家生地変冬丹皮薄荷服五刺復更衣語言乃清專用甘口錢核汁服連下黑矢五次舌蹇頓減漸啜稀糜乃去大黄加口錢核汁服連下黑矢五次舌蹇頓減漸啜稀糜乃去大黄加口。※下できた。

「四洋家生地変冬丹皮薄荷服五刺復更衣語言乃清專用甘い。」
「四洋家生地変冬丹皮薄荷服五刺復更衣語言乃清專用甘い。」
「四洋家生地変冬丹皮薄荷服五刺復更衣語言乃清專用甘い。」 凉充津滌熱又旬日舌色始淡্穀如常改以滋陰漸收全績。。。。。 王氏醫於賣圖學出三 三載聞以他疾移。 一藏字乃府字之譌柯氏云讀書無限病人無命此之謂也延 _

m Ċ 经稳热用处 K 迎桐富几

許芷卿商之

服之話絮不減或疑爲瀕似有搖惑之意孟英恐其再誤

卿極言治法之絲絲入扣復於

入所未發 出手眼實發前 能生占孟英獨 [有误補未有]

| 證 交 三 自答日夜不休乃去羚斛珠黄加西洋参生地大塊砾砂方三劑兩手漸柔汗亦漸收又五劑熱退痰降脈較和而包含 之 恙 僅 存 脈 オラミ 息得孟 |肝、無、血〇巻 學宛如 0 診於孟英。 兩 許 o

二十二日東北八八十八千八千

服後似有 投七郎效次日病者自云前此小溲業已通暢不甚覺熱昨樂 何證交三十五日昏痙譫語六晝夜不交睫旬日不沾米飲許 吳龍香孝廉三令嫒患感諸醫首以升散繼進温補至三月下 膝石斛木瓜桑枝藕肉數服痛止餐加又與峻補生肌而愈 日餘火上炎也仍與前方更吹錫類散而安惟臋瘡未飲腿痛っ 不已乃下焦氣血傷殘改用參耆歸芍生地合歡山藥麥冬牛。 團熱氣從心頭直趨於下由溺而泄從此神氣安

-

111日の東京の場所の田田のでは、1

芷卿視之儼似養雲室證卽拉孟英暨顧聽泉趙笛樓會診脈

獲o塊藥 絲o硃夢 潤且二便不秘尚有一綫生機未絕也換其受病原不甚重只合。。
を滑而微數齒不能開窺其舌縮苔垢孟英日尖雖卷色猶紅、、、。 **媪日病已踰月腰以下得毋有磨壞之虞乎皆曰無之惟數日**。 因謬治踰月誤藥釀成大證勢雖危險吾儕當協力援之第勿 再 0犯 味悖藥事或有濟醖香頗極信從孟英復詢其服事婢 。 NA E 必月事 0 竹黄 。石。 一首。 也。 ○孟英原 茹o蒲 知 母。錢。 屬其再 元の二級の一個である。 Q ၁

ここととのできているかられているから

|折之地而不能下行勢必薰蒸於上致有內陷入藏之逆也黑前大解黃色似乎無甚大熱不知熱由補藥所釀滯於腸胃曲 後夜始眠經緩息舌甫伸苔乃黑孟英於前方去鼈甲硃砂菖 ^輩粗忽竟未之知也昨藥服後證亦少滅孟英仍主原方四。 敷以珠黃滋以甘潤未能向愈孟英令以大蟾蜍治淨煮湯 **上天醫矣賣騙**一卷三 加生地卮子數服後苔轉黃大便黑如膠漆且有痰色蓋從 工用竹葉石膏湯加減四劑漸安而外患痛楚徹夜呻吟雖一而神識漸清餘熱復從氣分而達痰嗽不爽右脈滑搏盂之地而不能下行勢必薰蒸於上致有內陷入藏之逆也黑 八卽云王君明視隔垣小女腰下果已磨穿糜潰如柈婢 Ö Ч 服

這戊申夏已得子矣 閒適張舟甫之子為室或疑其病雖愈而過餌凉藥恐難受孕 溺濇仍求孟英診之左尺細數而芤右尺洪大是女勞復也研孟英以枳實巵豉湯而瘥數日後义昏沈欲寐發熱自汗舌絳 育陰充液之藥服之果痛止肌生眠食漸進汎事如期而瘳冬 語之果然與大劑滋陰清熱藥吞豭鼠矢而愈 。 而洪孟英投白虎湯二帖而安**遽食肥**甘復發壯熱脘悶昏、。 一月鋤令媳於廟見時忽目偏左視揚手妄言諸 17 :-

京本 好所 成者大英 旅名派 暖丸

赘遂愈次年即誕子 《汗亟令撤去火巯以

三王氏醫索贖騙尽簽三

帖而年餘之熱盡退糧與發陰藥而瘳

生附子擠貼,涌泉穴且嘴恋咬梨旗方用人参白虎湯投力

單小園巡檢患右腦痛醫與温運藥病益甚至於音瘡不

瓧

聲仰臥不能反側坐起則氣逆如奔便溺不行湯飲不進者 苦孟英爬其舌微释而苔色乾黄因 與海蛇鼠矢竹茄知母花。 趙子善合愛患發熱嘔吐口 枳實紫苑加雪藥服之一 粉杏貝巵斛之藥二劑果下未化宿食色醬粘膩設投俗尙温 燥消導法必致陰竭而亡糧往 三日矣孟英診其脈沈而粒與旋覆赭石薤白婁仁連夏茹貝 婦患帶下腰疼足心如烙不能移步盂英投大劑甘露飲而 一劑知數劑愈 1為便祕而年甫三齡不能自言病:、、。

許某於醉飽後腹中脹悶大解不行自恃强壯仍? 何新之亦儒醫也患風旬日胡七 日後腹痛猶疑爲寒又飲火酒兼吸洋烟倂小溲而不通矣繼oo 勿宜温補次年**偶病果爲珍** 二丁海でランド 日不過停食耳且飲山查 而即吐而起居如常也四朝走懇孟英珍之 · 順而體豐內顫證頗可危因婉言告。 神麴湯可也午後始覺指冷倦

礯○致○ポ 石○始○可 滚○山○當○ 旬後得 胸。听 加っぱ

是辛涼發散

養養醫邪乃は 分

致为初肺 孟英救之投白虎加哥 哈痰升復加麻黃八A 李 角 着 の壯 地 新 在 ○散 犀 角○致 囬 紫海 元0劇 O O 静 O 西洋麥竹葉而愈繼有房氏子亦爲 の畝 便不行參軍開其殆 通o 定端而喘汗 調口渴 の繁 0神 **碧敗瘈孟** 危 之 始 厭 授の 陸 o某 厚ο

匕

王氏醫案續編《卷三

為第一義治疹原以清肺

京子とも可引き孟英時其版を伏而滑胸腹無脹悶之苦旬酸比暈便祕醫謂神虚投補數帖反致時欲昏厥更醫作中風見之大為驚駄注目視之知為僧也遂亦釋然而次日卽不知見之大為驚駄注目視之知為僧也遂亦釋然而次日卽不知 河橋之北會過其門將及天曉適有帶髮頭陀由門前趨過瞥 杭城温元帥例於五月十六日出巡遣疫有魏氏女者家住横

即已乃· 碳0服0石0温 以 姚 下○餘↘ 王氏醫案贖 妣 灰。更 滚0補 次 o 痰o而 O 丸ぃ致 淬醋0 編門农工 及○病 當口 數 0 歸○劇 旋っ 巵 載0 腰 龍の也の 腿 > 連 諸 O o藥 巵の ○氣 問 丸o雪o 連。 羹o效o o遊 雪 羚ο孟 ξO o大 棟○英 OIF ()為數十 c卽 健飯 0絡0粒0筋 不 竹o謂 廖o 瀝○諸 瀝○腻♪ 菔ο厥 0應 絡o 亦 方υ者ο 吞o廣

峻攻不愈此大質謹

大湊 補二界上土地與前證

效o 以犀角生地 。 。

本o室

任殿

徐氏婦重身而患四肢疼痛不可屈伸藥之罔效或疑爲癱瘓。

| 検堅不肯移家人 藥果卽帖然 隨 此陰虚肝陽素盛之體暑邪吸入包絡亟宜移榻清凉之地 人驚以爲祟聞而朿手孟英督令移之如法灌錢新汲水調下可安而病者自言手足已受縲

王氏醫案續編一卷三 被0曾

九

一个断乳亦不及矣其家聞之尚未深信即日断乳服藥及秋而一个断乳亦不及矣其家聞之尚未深信即日断乳服藥及秋而一血之盛衰兹乳溢過中與草木將枯精華盡發於外者何異即一。 光絳曰急勞也無以藥為夫乳者血之所化也乳之多寡可疑大熱使然漸至減餐所親徐麗生囑延孟英視之脈細數 陳 、大熱使然漸至時 、大熱使然漸至時 、大婦素無病娩後 乳極多而善飯六月初 生意苡生の熱洞窩大学 扁o渇、 豆o澳丶 数○瘦 廿○英

and The State of t 「特別の 「特別の 「特別の 「大別の 「大別。 「大 「大 「大 「 、 「 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 以淸麟丸下之治。

曹泳之二尹將 氏醫案種稱 赴代 卷 代理昌化任而儋河、沙隐時而中之妙 寒、法 靡っ 一种固為危 |未載而治||一刺知二 其0為 上陰0危 溢液0候0身 而治 剜 法

氏階 朱續編 卷三 o赭o樞o察 呆o温 花0潟0 芩の機の其 芩○機○其 氣、補。 連○痰○脈、喘、病 粉υ痛い 銀○脹 棟○飮○絃、時、隨 花○溺、 貝ú杉o而、作o薬 石o赤o 菖o榈の耎、舌、劇の 育の汗へ連の出い 茹○風○数○絳ヽ至 膽o陽o乃o不、 翹に削い 星o肆o陰o語o 竹○疲○ 犀○横○虧○便、初○ 茹○脈・ **羚○禱 肝○瀉、渠** 等○至

仲 脄 金訪叔之室頗具卓識急煎孟英方灌之遂得生機次日復診藥凉不敢與服迨暮果欲厥矣眾皆皇皇幸彼女兄爲故孝廉念匏幕於江南族人皆應試入場侍疾者多毋黨伊叔少洪疑 秋久雨吳汾伯於鄉試後患恙自 心勉 主故舍人 爲寒溼之病孟英學 路清凉斯以向愈o 赤宮をいい、 日言坐於水號浸及於膝人

別芳言嘖嘖孟英級 騏主意必致全功盡棄囑其邀顧聽泉許 **非識信於平日焉能誠服於斯時聞其駿汗不收夜不成寐之** 子磁硃入數十帖乃得康復此證誤治即敗少謬亦必成損苟。 。 ○ 和犯温燥之薬先與輕清 後熱始退盡而駿汗不眠投以大劑滋填潛攝之藥兼吞五味。 慈濟室自春閒半產後發熱有時迄於季秋廣服滋陰之藥(1)(2)(3)(4)(4)(5)(6)(7)(7)(8)(9)(**齊貨政而顧許咸是孟英議於是主人之意益堅而大病乃** 八醞香日病由暑溼 而體極陰虧已從熱化不可以便泄 蕭解經用甘涼撒熱斯能安穀半月 III

. 1 Dade of to family the

型以岡元氣驟復不知餘燼內燔營受灼而血上溢液被爍而 便 游大渦舌苔黑刺孟英以犀 翹棟薄 桓連花粉元參大詩服之、、。、、。 の漸 知熊改投后連棟疾延胡橋核發蓉花粉製軍諸藥連解黑矢 竟不能愈其大 竟不能愈其大 下神清為去犀角加丹皮二帖苔化熱退惟少腹梗脹不甚。 以向安正欲養陰之際而惑於旁言另招金某服大 博泉令郎患感即兼腹痛而脹胡某投以温散了而熱退繼以小建中愈之 **只醫案禮稿** 卷三 大大父阿军 大大父阿军 瘦爲虛竟竭力補死而後已 寒O之可見留在疑望不在執方也 延孟英診脈按之豁然投當歸補飢 一便不行昏 、劑温補

其不能春乎果驗世人不辨證之陰陽但論藥之凉熱因而價嗽復作漸至咽痛冬初又延診於孟英日六脈皆數見於水令 向愈所親某亦涉獵醫<

牆滋陰藥不可過服投以温補已而。 瘧耳溼家多汗無恐也况口渴溺赤温補勿投與清解藥漸周 0000000日間間患膽多汗醫恐其脫與救逆湯而勢象孟英礦之日 氏醫案續編《卷三 A开醫恐其脫與救逆湯。 <u></u> 咳

俱宜如此看通達之論凡病

温心頂 胎o徒o寸o不c受 朱 必o以o脈o固o孕 砥 齊司 墮o俗o滑c或o後 卿 家摊厚貨 路省進 英o尚o大o由o病 產o 五歲體 。甚 壯o震o其o宜o其 徑 偉c 動o所c治c故c無 胞c以c病c日o效o 微 系o然c今c胎o今 感 其o而o右c之o秋 冬

竹o括o切 兩帖 憑○婁○之 菔○薤○難○ 和。旋0可 服∪覆○胸 《卷三 減0粉0也0 餘帖 **愈同時** - j · 四 發服

枝o相 挾、厥c瞀o復c里o-抹o太 茯o似o 人o橘o孟 風、屢 谷 0 脈、 常 而0絡0英 陽、服 安o羚c診、噫 其一羊o脈、卽 滇生之 中の見り 而、補 為一人與一人與一人與一人與一人與一人與一人, 重○虚、 茯c絃\不 加。絃、 苓○滑○已o夫 熟○細、豆o乃o向 人○地o滑o 也。致 爲 奥o汎 阮芸 大o恋o芸 臺 患腿 河 二素 卷o狹o以 金c阻D為 劑の或 於沙 所謂 鈴○於○虚○痛 柿○絲○在 而 素 帯o氣○都 病 海o不c時 孫o蛇o得o服 舒o英 30在 勒o宣c補 滑い脈 灣o也c劑 都 o雖 因 藕o以o竟 之(粒、喪 為0絲0不 成 舆 方 劑ω数、子 方ぃ瓜o能 吞o絡o愈o搓o也o子o 見o 或眉 滑c哀o當o竹o冬 歸○茹○閒 能○旋○旋 閒

服o內o中o連 愈。不 力o至o漸 與o也o則 氏醫素賣騙 有c或 煩 李 渴益 冬就 餘∪疑 凉c蕉 一年前 性o為 甚ぃ大 八名三 患 穳 微o热 夢の艺 前 聞加○按、能○英○大 熱o性o趙 竹o其、 化o身 秋 葉○脈丶燥○不 血の論 竹o沈·也o衣 跳 功○英 船 綿 以 京 不o日c進 茹の取、用 花o滑、生 ・○萬○士 面 粉○數○地 津o甘o分。 海o是 卽 虚○而○郎 多而 熱o凉c子 蛇の從 悶 蓬蓬 不o然c循o勃o前 瓦 滯 膦o之 莊o甘o毎 飢0世0時 銀の積 熾○味○啖 火 服 升 (之 o 迄今 巡 态的於 級c芩 婲 汁の衂

性類特 之推进 功可

人o內o宜o 之o盛c風o 體○者○温○ 氣○服○證○ 而。之。中。 施o則o救o 豈o喻c液o 拘o所o良o 乎の謂の薬の 英於前 子循之 如熊 則 稿0而 化o復 節の数と 方去 胎c與0 經 髮o大o 火 後六 煉 灰の劑の 則成 海0生0 帐 熈の地の 峭の銀の 加

加生地服 青0因の風の水高の鬼の水 也(仍大)不 上 无义堂经代典贝目的 《公二二 産性機灰五味之類温 血o止o 因o皆 熟o束 W 然而前胎因前の水手待斃矣復 乙咸用温 花c證 而唯是胎晦之後熟即為 為孟英觀之日此執死 · 城市息徽 粉o脈竹o或 酸澀旣助 旬日後各恙始平繼 源の不 変の知ら 冬而省 不食不眠問有呃式 其熱血盆奔流又容 腶 花。黄 上、 巵o黑 旋c見 抦 崩

小引

EL等於寶圖 NAO 小引 黃坤載陳修園之博而偏於温燥坐而言則可起而行則礙以 吳鞠通之明而混疫於温致招章虚谷之護更不知霍亂有寒 **葵李士材之派則其尤甚者也** 以治瘧雖尺有所短而瑕不掩瑜彼柯韻伯之辨而好爲穿鑿 古醫林自喻氏崛起之後攀賢迭出於斯爲盛然張路玉精於 論温而勞損之陰陽不別徐靈胎通乎古今之變而拘守柴胡 余承世業幼讀醫書

而閱歷二十年愈覺斯道之難精竊謂宋 元以來名家夥矣無不立言有所偏倚若薛立齊張會即趙養 國朝一切著述莫不邁越前

日子子名名名

抱有飲有爲有守之才故能鑄古鎔今隨機應變可以坐而言 聞道之晚也且知何有仁術志一書乃張趙諸君輯其近案猶 熱之分則尤陋矣此孟英霍亂論之所由述也余讀其皆神交 始得把臂快慰罕生賞奇析疑別聆妙悟翻恨相見太遲致余 未梓行余不敏敢不步塵續采以當執鞭之忻慕乎 可以起而行不愧爲一代之名家今春來越視樗里王姓之證 一章可杭復蒙寄示回春醫案二卷展釋之餘益信其

王氏醫案續編卷四原名仁衡志

吐竟不起の 紫黯乃肝鬱凝瘀也證難可愈復發難瘳予丹珍丹皮茺蔚旋。 覆脊巵柏葉鬱金海蛇之方覆杯果愈然不能懲忿踰二年復、 、 、 ·未春金朗然令堂陡吐狂血肢冷自汗盂英切脈粒澀察血、 杭 州王士雄孟英醫案 山陰陳 坤城安稍輯

張孟皐少府令堂年踰古稀患氣逆殿屎煩躁不寐孟英切脈張孟皐少府令堂年踰古稀患氣逆殿屎煩躁不寐孟英切脈 滑實且便関面赤舌絳痰多以承氣湯下之霍然踰年以他疾。 王氏醫案續編一卷四

證旗於危顧 辨證而例 廣服補劑 終o 似虚脱之證惟二 |致靑鹺尹令正患痰喘胡 囫圇颟顸翻 圖額預翻與證悖是以無功投以 病日以增孟英視之日固虛證之 昇庵參軍 |便不通院問苦風是痰熱為補樂所過。 孟英診之脈沈而澀體冷自汗、某進補腎納氣及二陳三子諸 熟っ當地の補 花o者o 客o想 坎○未 板ぃ分 身 胡り継

趙子循患喉痺渠叔笛樓用大劑生軍下之而薬不能入盂英 者之兄與次歐速盂英視之脈伏而紅滑與大劑犀羚茹貝知 電英商治渠不之信旬月後條然择城自寅正至辰初不甦病 張箎百之室患感連服温散繼邀顧聽泉診之云有縣變須延 矣。 川 省 木 以 助 氣 湖面虚右尺、地百合石英 巨天邊院與開了活回 すっ茯の 二陳故紙尚桂等以以除也宜乎愈補面愈劇 皆數為陰虧氣不濟納之候及閱前服方果雜つのののののののののののののののののののののののののののののののの以其左脈を替多雄夏草等樂一例知句日愈以其左脈を 知り

眠o次 氣 年 出 以錫 二五年三年和 汗 事 山 合 氣短不 病 苔o貨の 根 類散 二月誕 未 作息微氣並欲脫灌以後 行媳患心悸眩晕蛋质 敢吹之即開與白虎法而 1 [] **、脱灌以参湯の** 前 糕 74 腀 H 別の 載い 胩 胩

子恐有縣變深 孟英偶過診右 而 登 数 数 数 豣 姚某年未 腫再延孟英於之优數· 子雙令堂梁 萷 哀之際。 回り

越(所

卷

囚

安○葳○知○熱 ○逆〉周 焚○母○熾 益○壯○液 終し 愈0巵0棟0發 Fo質o刨 銀○鼠○爾○ ാ 📶 緑º石º根 瓜º英º帯 踰 何。 :0 小o帯 蠲の腸の JŤ 脈`麥 o 虛 淸○逆○可 沙の知の ko與o 劑 知ら 與.○ 嗽 ○ 沙 C 氣 **›** 石o元o 四 斛の参り

斯若等熱 故 因不 教 加 五 來 所 外 孫 本 來 外 界 本 來 外 界 本 來

秋敷 胡李權 令 正 許 子 雙 之 温邪痰嗽脘悶汗多孟英投 漏面黃腹脹緩食皆廢孟英用龜 吳萸橘皮杜仲故紙石脂 肢冷音嘶急激而共視之脈被為寒邪**但中**壓與人劑理中 **苑等薬三十劑而愈開者** <u>熬膏頻服而痊</u> 。 小麥茯苓藕肉蓮子心 **除權而蹇其夫人亦因** 食因於前方去沙參 十月下旬天氣驟 板海螵蛸 康次年夏其母夫人患 女真旱蓮貝母柏 悲戀而患前 加 0

C. T. I Waden of the Name of the

フェトー

虚勢為尤甚病均是此脈而

四

求疏方與西洋参元参二地一

讝語乃真陰欲匱外候雖較輕於康然不能

收積久

₩孟英於 投温補核 悲哀陡然發厥與甘麥大棗加龍牡龜鼈磁硃金箔龍眼何安。 年餘而起凡前後計用川只母七八斤他樂稱是今春因哭母 龍蒼八痛脹 小谷體厚善飲偶忠氣逆多醫成從虚治浙至 康副轉之證因怨治於孟英版甚 大平0月 可以下近往補美益初日 が表

2

灰卷

I

直是不通 有何干涉此 野 外矣與柴 科 形 何 热已现於川肺 凯 投且

葉の原 日の不 承 小手尋果不起っ ○ 令愛思感醫投 O 是瘄因温 邪 温散ルー の犀 而發所以起 土地石膏知母世世東温之珍柴和世界温之珍柴和 以疑為昏沈也 なお銀花竹 水升之宜其僚 何必再

王氏醫案贖編《卷四

京營服後即服

人啓篋易服公後即眠久而去

瓩

髮告別父母

火之上炎也與清凉滋降之法及硃黃等敷藥而不愈乃兄延 瞿 孟英往視舌心糜腐黄厚邊尖俱已無皮湯飲八口痛不可當。 安穩用養陰清熱而愈 依然獨共家靜守勿哭仍以前方加重和以竹瀝重溲灌下卽 此服藥所不能愈者合將錫類散慘之果卽霍然或疑喉藥治 舌何以敏捷如斯孟英日此散擅生肌蝕腐之長不但喉舌之 云欲往花神廟歸位人莫能攔舉家痛哭急迓孟英復視脈象 類山仲媳許培之之妹也患舌糜沈悅亭知其素稟陰虧虚。 。 以借用苟能隅反未可言罄貴用者之 Ĵ

減另招張某視之因謂專科誤用妻仁所致與參耆薑术鹿」 腐厚(M) 敢服季眉堅欲求方且云在此監服乃疏白頭洞瀉如火小溲不行因謂季眉日病猶可治第、、、。。。如即季眉請接於孟英按脈洪數其殆夤夜命四郞季眉請接於孟英按脈洪數 內果等藥泄瀉愈甚連服之熱壯神昏汗出不止勢頻於危 。 香孝廉徐夫人病者之從母也心慈似佛有子 **高祿卿室吳濂仲之妹也孟夏分娩發熱初疑蒸乳** 王氏醫表演 圖不必四 **小僅陰虚要須識此自知其故** 疏白頭翁 不退 角

○ 復定者术之方業已煎矣所親張芷舟孝廉聞之飛告於醖香 用前方而病家華譯以為產後最忌寒凉況洞泄數日乎仍招 地元參茹貝服半月始解黑色燥矢而眠食漸安第府藏之 處汾伯昆季卽馳至病家幸未入口奪琖傾之索盂英方煎而 所長大劑凉解服至七帖瀉全止熱盡退乃去白頭翁湯加生 張某商之張謂幸我屢投温補在前否則昨藥下嚥頃刻亡陽。

而從前温補將熱邪壅滯於膜絡之閒者復發數

葉等薬服至百劑始告全愈而天癸亦至孟英日世俗泥於產。 。 000 排眾論於危難之閒余雖見到不疑亦惡能有濟耶余嘗曰病 也或具隻跟誰其信之此證苟非汾伯昆仲篤信於平時而力 後宜温之謬說兄兼泄瀉即使温補而死病家不怨醫者無憾 宇宙開第 不易識尤不易患醫不易薦光不易任藥不易用尤不易服誠。 こことをはおり見る関ライスを 難事也而世人淺視之可不悲哉。 主 永 患 左 半 不 遂 伊 弟 笛 棲 監 高 き

疾熱與散數之

起秋初果殁 不眠心辣い (中和1 以為虚寒輒服温補へ **次
眠
食
已
復
而
素
嗜
厚**ア

急則治療を 不坚初方 方乃硬及 亦不易之 等薬出入為方一 O 三十劑後周身發疥瘡而贈 銀花茅根茹貝知柏 0 O 0

一補棄彼 比邱尼心能體厚蹒跚偶患眩悸醫以為虚久服温補。 令共々 腫 不機仲夏延孟英視之脈甚彩滑舌色光絳主清痰熱盡撤 出粘稠膜水而瀉止此諸經之伏熱得以宣泄也仍以此數 八服迨秋始愈冬朋能出門矣。 一之信仍服八味等方至季夏再屈孟英診之服數七 **主**發

金菜仙大令病其媳刲股以進因無效也悲

茯苓麥冬連翹竹茹竹葉蓮心小麥加以川 七情有傷痰因火迫堵塞空靈之所也與沙 神迷自汗驚惕畏冷改換補藥乃氣逆不進 投甘凉調理而痊。等分。即是一个多少。 「咽盂英先與犀角石膏竹蓮、剛便溏而止之乃至目赤譫。 茹○絳ゝ

下之徑愈 角元參滑石甘草知母花松 角元參滑石甘草知母花松 都城售透土長壽丹極言其功之大能治諸疾而價甚廉入皆 亭司馬服之咽爛孟英投多劑甘寒而愈王雪山久患下部畏 稱之孟英謂勿論其所用何藥執一方以寮百病無此治法每 以稟賦不齊證因有別勸人切勿輕嘗况以綠豆湯爲引必有 熱毒之品在內不可不愼也繼而張孟畢少府餌之患疽廣粵 **已无数据表表周围不公司** Ĺ

藥兼以當歸龍首人頻服新疾既廖腿亦漸温令其常飲柿冷吞未百丸齒痛目赤諸恙蜂起孟英察脈絃滑與多劑石 元○陳 麥嗽不已奶主前法服 。 射o弟 干o保 布左目及耳後皆腫方中加以鮮菊葉。 一等大劑淸肅之藥音開而咽糜吹以 愈其庶母同時患 **十餘帖而痊此** (證脈滑) 錢ぃ 兩o類 痛。

王氏醫素廣屬不参回

孟英診脈 退0犀0心) 法○脈 至二冬生地 不○數、 花o熟 [= 心欲い **苓物水** 強め 陰い 場 風ㅇ 動。 陽○散○ 而。咽 廖○愈 初0 銀物四〇叉

111人女司马大南八百明

頭草即の大東清智

通胃薬

淡

崩

類潛陽而 然c機o胸 0 復 。視 の 利 後浮 [滅音開] 取甚 尋卽睡去 在o亦、

死於補又夏醖泉延孟英視銭嫗腹痛欲絶證因見愁滑之脈塵心與連樸棟巵元胡蠶砂醒頭草等藥而康次年患咸復誤應者湖分耶于莊體素弱季秋患腹痛自汗肢冷息微咸謂元と放此涼潤旬日而痊 一再利與白薇に成眠孟英診で、水相槎令媳患 上 中外 济米 不 万 10万0醫、 っ虚い参 **好**o肝o利 ○鬱○反▶ 5○液○饞▶ 煤o渴o 量o夜。

東鼈甲竹源吞當歸龍替也親陳孟英察脈粒滑而數型金鈴延胡蓯蓉鼠矢服之石 在血與旋赭羚菇枳貝薤婁蛤殼為方痛乃漸下厥亦止再加之細而粒滑口苦便澀乃素體多痰風陽內鼓雖當崩後病不吳醞香大令仲媳汎愆而崩之後脘痛發厥自汗肢冷盂荚脈竹葉茵陳冬瓜皮而愈 刨 **教黄飲食不思孟英視之暑溼也與芩連銀花茅根桑葉巵棟** 愈其姓新泉之室懷娠患痢醫投温燥 一澀腹痛甚而偏 加

本語清青集知母膽星鼈甲金鈴旋獲元參竹憑 一本のででででででででです。 一本のでででででででででです。 一本のででででででででです。 一本のででででです。 一本のでででででいる。 一本のででででいる。 一本のでででいる。 一本のででいる。 一本のででは、 一本のででは、 一本のででは、 一本のでは、 一をでは、 一をで 石滚麥丸四服而平穩而腳氣大發腹痛便秘上衝於心肢冷。 平時喜服補藥或有眩暈不知爲風痰內動益疑爲元氣大虚

英鼠矢黃柏藕等薬而安

痛極昏厥咽糜水飲礙、。、、、。

出昏暈欲厥與連棟后茹小麥百合旋貝元胡烏藥雪

藥釀為病秋杪患寒熱如瘧善怒不眠苦渴易饑不能納食孟年前偶患崩而廣服温補遂成此恙始知先天陽氣雖充亦由

三天成牙行一婦年五十餘初患左目赤漸至發熱醫投温散廢復延孟英視之仍主前議果得漸康。 裁方初服三四劑飲食驟增舉家忻幸已而血漏甚多眠食欲 有薦吳古年診治者詢知病原作高年脫營論而以血脫益氣 厄楝萸連敷服而安踰年以他病卒 何新之令愛適湯氏孟冬分娩次日便瀉一 祭脈粒數倍常與清肺蠲痰柔肝充液之法漸以向安今冬 一项舌脊而渴與狹脊橋核當歸元胡龜板石英螵蛸茯苓 o、、、。 而厥進以補劑少腹宿寢攻痛勢極危殆丏孟英診之

高也 門之元虚此明 一 常居入九百 調之而愈。 人を大化されることの際は、服補薬牛月後眠食皆廢閒に 二劑未愈更醫謂虚進以補藥頗效渠信為實然今冬復病一劑未愈更醫謂虚進以補藥頗效渠信為實然今冬復病一的秋穀令愛年甫笄往歲患眩暈孟英切其脈滑作痰治服 **久虚欲脱** 福身得赤疹而痙止神清乃為隨以清 A而發也與大劑♥、 本面發也與大劑♥、
本書之脈
を
する。

「本書之脈を
でする。」

「本書之脈を
でする。」

「本書之脈を
でする。」 入劑犀羚元· 。。。。。 一肢と o痞 塞 毋○胎○

拘拘於 花○前○

服

卽

安。所 o以o失o不\投 汪 匝 氏 是o來o秋o食c補 m 以○業○閒○苦〉不 婦 胸○經○滯○渴〉輟○自 次○四○下○無〉延 孟 堵○月○原○溺○至 秋 量 也可 始能 不能 投o 起 欄。止。旋。 仲 患 赭이 ▶○屈 而o其o暑o盂 冬o痢 疼o墮o溼o英 兩、之 喘o而o熱o診 目、後 茹っ 嗽○補○爲○之○赤〉大 婁 殻の枳の花の 殼o 不0益0病0脈、障1 能○峻○旣○甚 麥o巵oi 又○肺○淸○數○氣ヽ禾 恐○胃○解○曰 遊\愈o 菊○婁○ ○下○逗○此 碳、己 ○行○留○温 眠○而 花○薤○ ○連ら ○之○而○補 脘\懷 至o枳o 下0分0為0所 疼\娠 o等o 甲○藥○ 泄o皆o溏o釀 拒\恐 而o挽o泄o之 之○數 脫○以○受○疾 類○服

o遊c孕o也o嗷v也o

物文。 安。枳c 連o障c補o 英履吉患痛吐孟英已為治愈冬仲復發他醫藥之己七日不 黄ο蒙ο

騎亦而○趁○便〉畢 一少海○乃、溯、古 此○病 ⊅通○乃 炳 爽。如 也 年中。故。令 以 年等其O高 夾○如 滯o來 胃○年 也o盂 堂o他z與o陰 而0按1近 終0薤0温0痰0嗽 未。脈、古 紫。邪。氣、礙 化0粒、稀0 苑○在○逆〉眠 c便 **兜○肺○自、醫** 與o緩、患 鈴o未 杏 經 孟 補 貝○淸 英 攝○苔 多。化。切而、退 瓜。率 脈。至、知 子。為 右、游、襲 子o為 右、游 甘o補 寸、淚 桔o栗 沈、全、愈。孟 旋○所 滑o無o 茹○錭○左、〕 o宜o手、閉 劑○開○細い 豆○無、服 而○其○數১僟○ 安。源。而)

E无路長賣屬 袋四 Ķ

逆○聚 知○慮 余昔曾服参茸大補之藥而陽麥今服君方而 《眠痰多畏冷自問不能起矣孟英曰無恐也不過。 (眠痰多畏冷自問不能起矣孟英曰無恐也不過問其質於孟英按脈滑數舌絳苔黄渇飲溲赤動則) 司

	g · · · · ·	 Na _k ii	والمراجعة والمراجعة
主氏醫案實編一卷四	王氏醫案續編卷四終	知察覚 整龍 不慎和也	1
七			

Ï

綱編卷五原名七術:志

杭州王士雄孟英醫案 -黒血数升継即大吐鮮紅之·
連・声・きでといいいい 武進董

熱楽則未服也惟多閒久

日も竹を野島でおる

粥。脹 龍 答の餅 兩旬外便溺之色皆正與滋 加麥冬天冬女貞早蓮投之眠食以龜板鼈甲服三帖神氣始清谷 與酉秋以他疾移。 o熟o 貼涌泉穴 やいれての大変である。 c生。 小りの焼鉄戸地銀花線戸 引納浮陽兩 補藥調痊仍充撫 之眠食日安半月後始如清各恙漸息稍能啜如病径陽兩服血止左 。巵。 冷吸其 o痙

脈堅體厚口渴苔黃投知蘗巵楝犀苑婁茹之藥送當歸龍薈運糧千總馬香谷患溺祕欲死所親趙春山司馬延孟英視之。 謝某患嗽臥難偏左孟英切其脈右 **丸而瘳竟不復發**

漸效 化補藥斷不可投與知苓婁杏翹貝旋茹連斛雪羹爲方服果 汗出口渴不饑或慮高年欲脫孟夾曰此温邪挾素盛之痰所、の、、。。
許叔超令大母患瘧延孟英治之脈粒消而敷脘悶便秘合目 而有紅光脈粒洪而芤詢知冬閒廣服助腸藥是熱亢陰虚炎田年踰花甲陡患鼻衂諸法不能止速盂夾枚之面色黑 一證與大劑犀角元參茅根女貞早蓮石斛茯苓澤

FO生c麥o龍o傷o食、不 安の 子滋陰藥 透點o大o珠o心o面 法C杲O之C鼈C越O冷o于 穴0外0甲0内0徹 甫 以0貝0風0夜 以o貝o風o夜、 英の 服 焼っ母の鴆の不、脈 、從 而 鐵○竹○張○膜○至、女 康に 即煎 秘·他c 洪、 親薦 胡 令o葉o明 日0豁、初 吸o辰c手o證o大o患 進場。某 其0砂0未 雖o左、感o 氣o小c投 屬o手 往 蠣つ麥の温 温。為、教 視ㅇ 粉0元、散0而0尤0之 大 撲0參0尙 與O大 斥 止c丹o可 陰o渴、進

昏瞀忽見世父啓東扼 **瘧孟英投以清解巳得向安胡某聞之復**。 服王藥漸以向愈而陰不 之意 奖 不能下盛且囑云宜服王 つなの不つなついの法の 甲等藥善其後秋杪歸 0 留戀再服清 恐典で 寧o

科治之勢益張肢疾 原鶴亭令郎年甫五 服 劑各恙皆減溲赤便 **正氏醫案演編**人卷五 不眠臥榻不起病者堅卻其藥然已進二十劑矣再邀何胃氣倍加繼而救哪不傳黃芒滿亦則消沙醫戸季子多 加 小o祖 陷c何 繼 而痰嗽 つ疾 加い之 c石c邀 四赤嘔吐苔黄; 饑黃苔滿布肌消 0粉0脈 **汎斷** 四 栗○敷○時 內熱汗多 ·發、 C壯、 をひ按0證 便、芬 新

不至陡動而大便泄瀉脈 「何播階令正素患肝脈仲 康復の 何播階 摤 英商之 至っ皮の心へ 硃つ心つ熾の 。思煩躁 甘o其o而 麥o火o痰 甲石斛茯苓竹 東○貨○於 之 ※○等>中 左 其○美○也。脈 o化o先o粒 地の其の以の 桑o右、温 菊o耎、藥o o寐o治 酸o因 補0邀 o元o虚

| 「本意 | 「本 後而痊 菩喔無汗

| 茹蘆根服之腫卽消職佐滋陰齦疼亦止|| 其肺胃之痰熱者投白虎加沙參花粉多瓜皮枇杷葉巵子竹 日以劇氣逆不饑孟英察脈左洪數右粒滑陰分雖虚先當清石北涯令正久患觀疼漸至身面浮腫或以爲虚成以爲溼病 全 愈っ

信捷 藥如法故收效 之澀以固之用 以堅之螵蛸 **泛联条** 以海坝 黄檗為方服之漸愈仲弘夏診視兩尺皆浮左寸問 徳清蔡初泉陡發寒熱咽痛大渴脫悶舌释孟英診脈甚數 矣 而 投 而胎墮矣 不知病久初痊正須培養雖即受孕酒蓄無權果至仲為方服之漸愈仲秋診其脈即斷受孕渠謂懷娠必無 媳.0 H 至。 O 一地蒿酸な旧之弗廖

柏o孟

娠必無病

赤疹而熱退知饑 僅能

藥數劑始安積加生地二至二冬滋養而愈次年患病仍為誤劑補而血下漏也與犀角元參茅根柏葉尼楝知解花粉白薇等處地投以腎氣湯而寒熟漸作改從建中法旬日後病劇而崩臭誦青室年近五旬天癸已絕偶患腹胀局醫黃某知其體素 栗而殞。 阮範書明府令正忠腹痛欲厥醫見其體甚弱也與鎮逆通

氏醫案讀漏べ於丘

歸○應○泡○茹○耎 再服 己不能治矣。一位は多瓜子が一方では治矣。 煎。旋。神。 服。斛。是 投c冬o浆 ጮ氣o難 抑 □【●】 c絅o枕o茵 鼈○氣○孟 o不c英 ○氣○脈 之。爲。補。 孟英自 策の劑の皆の也の前の難の 熟c任o O數o刺 地C與

前ㅇ

白虎湯與之渠 究方閥之湯雖白虎而石膏既少且煨兼不 大悟服 雌同君薬已基 源仲云沈顧 角而去米加花粉竹茹等其力不同 軍脫痛 利 始 念 君皆主 (去米因謂其兄 方屢 服無效孟 長疏 同科矣 也 ○翻

日子なりなる内面の一人のよう **餅湯以杜關格於將來迨今四月閒形體日瘦**。 年誤餌透土丹之時孟英診治向愈即獨其常飲 海c 候c膝:孟 也c桃o英 澤o之為

○求 英 ○治○以 外風補氣で 乾 胶o 字根等出入為方服之寒熱 影翻 場 c服 茹o降 o則 被高 肝陰 好然月も一〇日人為課慮所傷最怕情活 の痰含物 斛 巵o新棟o襲 孟 明限圖之 章 村 校 格 開 格 犯即 《痛亦滅 緑のえ 瓜o勢 絡o將 冬o成c **瓜**º再 闂

其卓見已不可及而見危受命勉力圖維陽熱心孤更可欽也 以麻黄細辛鹿角等藥投之遂至舌色乾紫津涸而亡不知者。 未免以成敗論所謂道高謗多然柿餅湯投于年餘未病之前 孟英設法且云讀君之案洞徹病情徼幸戍全足成再生之德 即使無效我亦瞋目而亡孟英感其言殫竭心力以圖久延無 而始解上則吐痰惡穀果成關格之候属至伊子旋杭惑於讚 聽泉吳卯君任心柏諸君商之方案皆與孟英相合雪山轉懸 如嗔怒繁思諸多楼觸頻有轉關屢生枝節大便必極搥背兄如嗔怒繁思諸多楼觸頻有轉關屢生枝節大便必極搥背兄 言翻以竹茹竹遯為栗性太凉而以不用温補爲誘求乩方徑。 。 茶機を加入を力

徐夢香年近六旬患 石。視 菖。之。 滿。脈 一劑知二 四月期神清乃去养菖加湖中超月子桑莱菊花楝斛红色子桑莱菊花楝斛红色 知機納穀漸以調理而愈匝月卽能作 中c顫 Ţ c粉e服 投之下利 竹o套 o應o湯 面赤急 銀0也0 花o與

着 美 属者

覆去竹苑蓯蓉投三帖而昏痙不作又去薤楝加生地花粉服茹貝燕窩藕兩劑而觀紅頦汗皆蠲繼佐麥瀝薤麥枇杷葉旋。0000 許正卿患外寒須覆重衾內熱飲不解渴仍能安穀便溺皆行 排眾論病家始有把握與孟英意見相合渚何君新之也慫恿 角地黄湯者有欲大劑温補者有執小柴胡加減者賴孟英力 五日而瘧休飲食漸加居然告愈方瘧勢被猖之際鼎如上水 兩昆仲頗以爲憂延諸各家議治有主人參白虎湯者有用犀 投以温散即顧咽疼盂英贩之

廖一外侵與羚貝茹厄翹發桑菊丹皮花粉旋覆以瀘菔湯煎服而一外侵與羚貝茹厄翹發桑菊丹皮花粉旋覆以瀘菔湯煎服而一 **劑兩帖而寒渴咽疼皆滅乃去犀羚牛蒡加二至知母花粉銀** 進以温補勢益劇孟英版之版粒數右滑溢乃韓組林年近古稀孟冬患肢厥頭腫讝語遗溺 花解醬矢而寥っ 錢聞遠仲郎患感湯某進桂樸薑柴等藥而痰血頻咯神瞀耳 王天踏装演編 多丘 一 蒙語便溏不饑大渴苔黑溲少徹夜無眠范應樞顧聽泉叠 。 兰 八痰熱內阻風温、物包某作虚風類

橘o烯o視 朱 劑 百。以細、合。西。數。等。洋。乃 熱 細、輕 核o而o之o湘 退鴻 旋○熱○厥、槎 Eo伏o甫、令 ○厥○回、即 止○藥○參○眞○ ○陰○而、留 渴 二 生○陰○ ○肝 腹、耕○始 劑 地○素○ o厥o回、即 地。素。退二。虧。舌 滅 路 加 ho氣o痛、忽 之○無○異 至。營 哪口、食和O止o多o爱c津池(極、後旬 浆 龜o爍o外) 也o苦、大日出 板o葉 後解 渴o吐 ● (原) 原。 ● (原) 原 ● (不) 所 ● (不) 所 ● (不) 所 ● (不) 所 不能措手孟 便行而 痊○糜○花○食○ 元o版、息 夜能稍 藕o而 愈o胡o來、微o 汁o畏 蓯○紋丶 梨o滋 奪○緩○延 寐o 汁c 鳳 連。痰。英 葳o也c脈

甲o行o乾 二。*久* 至。冶 如熱湯C熱補進 然o膠 換c鹹 粒、為 - 餘日胸痞 眠、兩

聽泉多劑淸解未應孟英切其脈左陳赤堂令正患感而赤不暇煩躁膽 Eli 知c不 薢 榖c 以向 (踰年接) 等藥服後 愈o粉c 一帖而苔卽退黃再服而黑矢下神氣便祕胸次拒按脈粒緩而滑投涼隔散感發疹沈悅亭治以淸解熱漸退而神 上七八劑 温 **秘、語o** 熱阻 洪、 姐 而、甘、 連c數 湯、 那 右、 而、濇、溢。而、 氣 散c神 清c加c氣 放c神 0

龍薈八譜語山且能服参以通路的合温騰雪羹加旋薤投之 帶時下乳汁全無兩點 海螵蛸五倍子等分類 翁嘉順令正娩後陰戸隊 陰和胃而痊 |日始求治于孟英令以澤蘭葉| 天然一天 真扇 人名丘 地 の 服 の 漏 海 粉 村 の 前 の 現 本 本 之 の 本 本 之 の 投之胸結漸開乃去半種 通幽湯下其黑矢三次後始進 ホテ以通之と 果即収上 大○亦棗○屬 精。大走。 米。左。 之孟英日此血虚 Š 茵 送。 少庸 和。 肉c診

子o您o许 是某思夢遺久治了 為藥服後乳汁 木o內 含素の食物を 通o有 入治不愈 乳汁漸充。 頭 為 金 五 英 二 英 二 英 二 英 二 英 二 英 二 英 二 o雪o視 田魚 旋o澀o病 滑。 *右虚 東以日、 東京 東京 東京 難開戸 巵o苦、發 才○胸 茺○黯○悶 升o 封0背、 作。 蔚o汎 腹 髓c麥、 脹○投 加c疼o 車0雖 當。 喘 <u>前o不</u> 能o微

无下黑血洩即随通繼而更衣養**己亦黑**遂愈 王氏醫案卷五原名仁務志